

Streszczenie

Anna Pleszewa

Temat pracy: Ocena jakości życia chorych na raka jajnika otrzymujących chemioterapię pierwszego rzutu w warunkach dziennej hospitalizacji

Słowa kluczowe: rak jajnika, jakość życia, kwestionariusz QLQ-C30 i QLQ-OV28, chemioterapia pierwszego rzutu

Rak jajnika jest najgorzej rokującym nowotworem ginekologicznym i stanowi poważny problem kliniczny i społeczny.

Celem pracy była ocena jakości życia pacjentek w aspekcie emocjonalnym, poznawczym, fizycznym i społecznym. Analiza wpływu objawów ubocznych na jakość życia badanych z uwzględnieniem serii chemioterapii. Analiza wpływu wybranych czynników klinicznych i socjodemograficznych na ocenę jakości życia pacjentek podczas leczenia systemowego.

Badaniem objęto grupę 100 pacjentek z rozpoznaniem raka jajnika, które były leczone chemioterapią w warunkach dziennej hospitalizacji w Oddziale Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Chore zostały poddane standardowemu leczeniu schematem: paklitaksel w dawce 175 mg/m² w 3- godzinnym wlewie wraz z karboplatyną w dawce AUC 6 (5-7) wg Calverta w 1- godzinnym wlewie przez 6 cykli podawanym co 21 dni.

Wykorzystano standaryzowane kwestionariusze wersji polskiej EORTC QLQ-C30 i QLQ-OV28, FACIT-F. Celem oceny wpływu czynników klinicznych na jakość życia chorych dokonano analizy dokumentacji historii choroby pacjenta.

Stwierdzono, że im niższy poziom ogólnego stanu zdrowia przy kolejnych seriach leczenia cytostatykami tym wartości średnie uzyskanych wyników skali funkcjonalnych w aspekcie emocjonalnym, poznawczym, fizycznym i społecznym również są niższe na każdym kolejnym etapie badania, co wpływa na niższą jakość życia chorych. Z analizy zebranego materiału wynika, że najwyższy poziom ogólnego stanu zdrowia i jakości życia pacjentki raportowały na pierwszym etapie badania, średnia liczbowa to 59,67 punktów, natomiast najniższy na czwartym etapie badania, średnia 45,04 punktów. Szczegółowa analiza danych wskazuje, że pacjentki uzyskały najwyższy wynik na czterech etapach badania w zakresie funkcjonowania

poznawczego. Średnia na pierwszym etapie badania wynosiła 77 punktów, natomiast na czwartym etapie badania 57,98 punktów. Badania wskazują, że najniższą jakość życia, podczas całego procesu badawczego pacjentki reprezentowały w zakresie funkcjonowania społecznego. Średnia liczbowa na skali funkcjonowania społecznego na pierwszym etapie wynosiła 63,50 punktów, a w czwartym etapie 35,11 punktów.

Problem objawów ubocznych takich jak: nudności, wymioty, dotyczył całej grupy badanej i był zdecydowanie bardziej uciążliwy w końcowym etapie leczenia dla wszystkich pacjentek. Na pierwszym etapie badania w skali objawów nudności i wymioty średni wynik to 16 punktów, natomiast w czwartym etapie średni wynik wynosił 40,07 punktów.

Spośród czynników klinicznych objaw zmęczenia stanowił najpoważniejszy problem zdrowotny badanych. Wynik średni skali zmęczenia na pierwszym etapie badania wynosił 37,11 punktów, natomiast na czwartym etapie badania uzyskano wynik 70,33 punkty.

Kobiety z rakiem jajnika podczas chemioterapii wymagają szczególnego wsparcia psychologa, dietetyka i fizjoterapeuty.

Data

Poznań, 24.01.2022

Podpis

Anna Pleszczyńska